

VERTEX HI-N

Azotlu Gübre Çözeltisi

EC FERTILIZER

Garanti edilen içerik (% w/w)

Toplam Azot (N)	: 25
Üre Azotu	: 12,4
Nitrat Azotu	: 7,2
Amonyum Azotu	: 5,4
Suda Çözünür Bakır (Cu)	: 0,3
Suda Çözünür Mangan (Mn)	: 0,6

**Asla uygun doz oranlarını aşmayınız.
Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.**




**NET 1,34 Kg
HACİM 1 Litre**

Üretici Firma

Headland Agrochemicals Ltd., Rectors Lane, Pentre Flintshire CH5 2DH, United Kingdom
Tel: + 44 (0) 1244 537370; Fax: + 44 (0) 1244 532097; İngiltere
enquiry@headlandgroup.com; www.headland-ag.co.uk

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriğinin etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.



VERTEX HI-N ; Yaprığın dengeli bir şekilde beslenebilmesi için yüksek oranda azot ile birlikte ilave mikro besin maddeleri içeren bir yaprak gübresidir.
Hi-N, özellikle bitkilerin hızlı geliştiği dönemlerde veya stres koşullarında faydalıdır.

KULLANIM YERİ ZAMANI VE DOZU

Yaprak gübrelmesi: VERTEX HI-N; her çeşit üründe 100-150cc/100 lt su oranında yapraktan püskürtülerek uygulanır. Sezon boyunca dekara 1 litreden fazla uygulama yapmayınız. En uygun uygulama zamanı, sabah erken ya da öğleden sonradır.

Tahıllar : Sap uzama ile başaklanma arasındaki dönemde, 150cc / 100 lt su oranında yapraktan uygulanır. Birinci uygulama ile ikinci uygulama arasında 3 haftalık süre olmalıdır.

Şeker pancarı: Bitkinin hızlı gelişme gösterdiği üç yapraklı dönemden itibaren 100 cc /100 lt su dozunda uygulanır. Birinci uygulama ile ikinci uygulama arasında 3 haftalık süre olmalıdır.

Sebzeler: Domates, biber, patlıcan, karpuz, kavun, kabak, hıyar, patates, yumru köklü sebzeler, çilek, soğan ve sarmısak.

Yeterli yapraklanma oluştuğunda, 100-150cc / 100 lt su dozunda yapraktan uygulanır. Gerekli olduğu durumlarda gelişme dönemi boyunca üç hafta aralıklarla uygulama tekrarlanır.

Meyve ağaçları: Bağ, turunçgiller, yumuşak ve sert çekirdekli meyveler, nar, muz ve zeytin.

Çiçeklenme öncesi ve meyvelerin gelişme dönemi boyunca 150 cc /100 lt su dozunda yapraktan uygulanır. Turunçgiller için çiçeklenmeden önce bahar sürgünlerine uygulanır , yaz ve sonbahar sürgünleri için de aynı dozda tekrarlanır.

Sera bitkileri : Domates , biber , patlıcan , hıyar, kavun ve çilek .

Bitkilerin vegetatif gelişme döneminde 100-150 cc / 100 lt su dozunda yapraktan uygulanır. Gerekli olduğu durumlarda aynı dozda uygulama tekrarlanır.

Süs bitkileri : Gelişme dönemi boyunca 15-20 gün aralıklarla 100 cc / 100 lt su dozunda uygulanır.

DİĞER KİMYASALLARLA KARIŞILIRLIK

VERTEX HI-N birçok tarım kimyasalı ile birlikte karışabilir. VERTEX HI-N yağlarla ve cyproconazole'lü bileşiklerle karıştırılmaz. Şüpheli durumlarda önce küçük bir kaptaki karışım testi yapılmalıdır. Mutlaka uzman tavsiyesine göre kullanılmalıdır.

RİSK VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

Çocuklardan uzak tutunuz.

Yutulduğunda zararlıdır, hemen doktora başvurunuz.

Deri ve göz temasında derhal bol su ile yıkayınız.

Maske, gözlük ve eldiven kullanınız.

Gıdalardan ve hayvan yemlerinden uzakta muhafaza ediniz.

Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.

DEPOLAMA KOŞULLARI

Dondan koruyunuz. Depolama sıcaklığı +5 ile +30°C dir. Direk güneş ışığına maruz bırakmayınız. Taşıma ve depolama esnasında koliler ters çevrilmemelidir.

Parti No :

Lisans No: 402

Üretim Tarihi :

Tescil No :

Son Kullanma Tarihi : Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

İthalat ve Dağıtım:

Çamlı Yem Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Eski Kemalpaşa Yolu, Pınar Süt Yanı

PINARBAŞI-İZMİR

Tel:(232) 4362021 Fax: (232) 4362022



Piyasaya sunacağımız ürünün içeriğinin etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynısı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.

